

Link do produktu: <https://androsklep.pl/florovit-do-iglakow-przeciw-brązowieniu-1-kg-p-1935.html>



Florovit do iglaków przeciw brązowieniu 1 kg

Cena **16,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **1662**

Opis produktu

FLOROVIT Nawóz przeciw brązowieniu igieł 1kg worek

Najczęstszą przyczyną obumierania drzew iglastych jest niedobór składników pokarmowych. Po pewnym czasie od posadzenia następuje zmiana koloru igieł do jasnozielonego, następnie żółtego, w końcu igły brunatnieją i opadają, a drzewo obumiera. Opisane objawy nie są spowodowane przez szkodniki.

Są to skutki niewłaściwego zaopatrzenia w składniki pokarmowe (najczęściej występuje niedobór magnezu). Przystawalność składników z gleby zmniejsza się bardzo w glebie suchej, dlatego opisane objawy niedoboru najczęściej widoczne są w okresach suszy. Niedoborom tym można zapobiegać poprzez dostarczenie drzewom magnezu, zarówno w drodze nawożenia doglebowego, jak i również dokarmiania dolistnego.

Florovit zawiera składniki mineralne w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu ozdobnych roślin iglastych takich jak cis, modrzew, cyprys, świerk, sosna, jodła itp.

Zalety stosowania nawozu Florovit przeciw brązowieniu igieł:

- przeciwdziała brązowieniu i opadaniu igieł
- zapobiega niedoborom magnezu
- zawiera niezbędne składniki pokarmowe
- zapewnia piękny wygląd i intensywny wzrost roślin iglastych
-
- **Stosowanie nawozu FLOROVIT:**

Zalecaną dawkę nawozu rozsypać równomiernie pod koroną drzew lub krzewów. Następnie należy rośliny obficie podlać. Nawóz można stosować przez cały rok w miarę potrzeb. Szczególnie wskazane jest stosowanie nawozu w momencie pojawienia się pierwszych objawów brunatnienia igieł.

Nawóz można stosować również w formie oprysków dolistnych. Do tego zabiegu zaleca się około 5% roztwór nawozu (500 g nawozu na 10 l wody). Przy silnym niedoborze zabieg ten należy powtórzyć 2 - 3 razy w odstępach 14-dniowych.

Przed wegetacją: Dawkę jednorazową 25 g/m² powierzchni uprawnej należy wymieszać z co najmniej 10-centymetrową warstwą gleby.

Pogłównie: Dawkę jednorazową 10 g/m² powierzchni uprawnej należy stosować posypowo lub dolistnie, opryskując rośliny

5% roztworem przy zużyciu 50-100 ml cieczy użytkowej na 1 m² powierzchni uprawnej.

Wielkość drzewa lub krzewu - Zalecana dawka:

do 1 m - 25 g/m²
od 1 m do 2 m - 50 g/m²
od 2 m do 5 m - 100 g/m²
od 5 m do 10 m - 150 g/m²
powyżej 10 m - 200 g/m²

Termin stosowania: marzec - wrzesień

Skład nawozu: NAWÓZ WE Typ nawozu - siarczan magnezu. 16,0% (MgO) tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie; 32,0% (SO₃) trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie